



**PBS DGA Spółka z o.o.**  
ul. Junaków 2  
81-812 Sopot  
tel. +48 58 550 60 70  
fax +48 58 550 66 70  
kontakt@pbsdga.pl  
www.pbsdga.pl

# **Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w mieście Kraków**

## **Raport porównawczy**

**Warszawa-Sopot  
2007**

# ANALIZA WYNIKÓW

## I. Wprowadzenie

Aby zapewnić porównywalność wyników badań „**Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną**” realizowanych w 2007 na reprezentatywnej próbie uczniów II klas gimnazjów i III klas szkół ponadgimnazjalnych krakowskich szkół, w badaniach terenowych zastosowano dwa rodzaje kwestionariuszy. Pierwszy z nich był taki sam, jak narzędzie używane w badaniach ESPAD zrealizowanych w Krakowie w 1999 r. (i w badaniach ogólnopolskich - 1999). Druga ankieta jest nowym narzędziem badawczym opracowanym i sprawdzonym (w badaniach pilotażowych) przez zespół europejskich ekspertów skupionych wokół projektu ESPAD (zawiera szereg modyfikacji oraz kilka nowych pytań). W tej sytuacji, aby zapewnić porównywalność wyników zarówno z poprzednimi badaniami z 1999 roku, jak i tegorocznymi badaniami ogólnopolskimi i badaniami prowadzonymi w tym samym okresie w 40 krajach europejskich zdecydowano, iż co czwarty uczeń w wylosowanej klasie otrzyma do wypełnienia „starą wersją ankiety” (z 1999 r.) a pozostałe 75% będzie wypełniało „nową wersję ankiety” (2007).

Wyniki badań młodzieży szkolnej, przeprowadzone w Krakowie w 1999 r. (w tych samych grupach wiekowych tj. wśród uczniów II kl. gimnazjów i III kl. szkół ponadgimnazjalnych) prezentujemy Państwu w zestawieniu z wynikami tegorocznych badań zrealizowanych w maju i czerwcu 2007 r. **Ze względu na porównywalność narzędzi badawczych punktem odniesienia do wyników badań z 1999 r. powinna być „stara wersja ankiety”.**

Należy jednak podkreślić, iż wielkość próby zrealizowanej w tegorocznych badaniach wg. „starej ankiety” (z powodu ograniczeń finansowych) była znacznie mniejsza, niż w badaniach z 1999 r., co w znaczący sposób wpływa na wielkość błędu oszacowania, który sięga 9%. Trudno jest też jednoznacznie stwierdzić, czy lepsze oszacowanie skali problemów daje nam „stara”, czy też „nowa” wersja ankiety. Faktem jest, że w wielu miejscach narzędzia te istotnie się różnią (nieco inaczej sformułowane pytanie, zadane w innym kontekście, przy zastosowaniu rozszerzonej skali odpowiedzi) dlatego uzyskane wyniki w wielu miejscach np. w części dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, bardzo się różnią i są nieporównywalne. Dlatego też w przedstawionych tablicach porównawczych prezentujemy Państwu wyniki uzyskane w 2007 r. zarówno na podstawie „starej”, jak i „nowej” wersji kwestionariusza.

## II. Palenie tytoniu

Porównując wyniki badań dotyczące palenia papierosów przez krakowskich nastolatków w roku 1999 i obecnie tj. w 2007 r. należy zwrócić uwagę na bardzo pozytywną zmianę, jaka zdarzyła się w tym zakresie. **O połowę zwiększył się odsetek gimnazjalistów (uczniów klas III), którzy nigdy nie palili tytoniu.** W badaniach przeprowadzonych w 1999 r., co trzeci badany uczeń III kl. gimnazjum (33%) deklarował, iż jeszcze nigdy nie palił papierosów, obecnie w 2007 r. odnotowano (istotny statystycznie) wzrost odsetka takich respondentów sięgający

prawie 50%. Zgodnie z tzw. „starą wersją ankiety” odsetek ten wynosi 49% zaś oszacowanie tego wskaźnika na podstawie „nowej wersji ankiety” sięga 52%.

W grupie uczniów II kl. szkół ponadgimnazjalnych również odnotowano pozytywną zmianę w tym zakresie, choć skala tej zmiany wydaje się nieco mniejsza niż w gimnazjach. W 1999 r., co czwarty uczeń w wieku 17-18 lat nigdy nie palił papierosów (25%) a obecnie odsetek takich respondentów sięga 1/3 badanej frakcji (32% na podstawie „starej wersji ankiety”).

Warto także zwrócić uwagę na **istotne zmniejszenie się populacji uczniów, którzy palili papierosy 40 lub więcej razy w życiu**. W grupie gimnazjalistów odnotowano spadek tego typu respondentów z 30% w 1999 r. do 19% w 2007 r. (na podstawie „starej wersji ankiety”). W populacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych również stwierdzono istotny spadek w tym zakresie – z 39% w 1999 r. do 28% w 2007 r. („stara ankieta”). **Zmiany w częstotliwości palenia objęły głównie chłopców**, w populacji dziewcząt nie są one statystycznie istotne. Wśród uczniów III klas gimnazjów odsetek chłopców palących kiedykolwiek w życiu 40 razy lub więcej zmniejszył się prawie o połowę – z 35% w 1999 r. do 18% w 2007 r., zaś w starszej badanej frakcji 17-18-latków populacja często sięgających po papierosy zmniejszyła się o 1/3 – z 43% w 1999 r. do 28% w 2007 r.

Pozytywne tendencje widać również wśród nastolatków palących w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Istotna statystycznie różnica pojawia się w grupie gimnazjalistów - odsetek tych, którzy nie palili w ciągu ostatnich 30 dni zwiększył się z 63% w 1999 r. do 76% w 2007 r. W starszej frakcji badanych również odnotowano pozytywną zmianę ale jest ona wyraźnie mniejsza (odpowiednio: z 57% (1999) do 65% (2007)).

### III. Picie napojów alkoholowych

Analizując wyniki tegorocznych badań dotyczące picia alkoholu przez krakowską młodzież i odnosząc je do wyników takich samych badań sprzed ośmiu lat (z 1999 r.) można stwierdzić, iż nie zaszły w tym zakresie jakieś poważniejsze zmiany. Poziom rozpowszechnienia konsumpcji alkoholu wśród nastolatków utrzymuje się w podobnych granicach, a występujące zróżnicowania (największe dotyczą picia alkoholu w czasie 30 dni przed badaniem) nie są statystycznie istotne.

**Jedyna poważna i niestety niekorzystna zmiana dotyczy picia alkoholu przez starsze dziewczęta (z III klas szkół ponadgimnazjalnych) w ciągu ostatnich 30 dni**. Odsetek uczennic, które deklarowały sięganie po alkohol w ostatnim miesiącu zwiększył się z 66% w 1999 r. do 76% w 2007 r. Zmiana ta ma bezpośredni związek ze znaczącym wzrostem popularności wódki (i innych napojów spirytusowych) w starszej grupie badanych dziewcząt (patrz: Tabela 8b.). W 1999 r. w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem do picia wódki przyznawało się 38% a obecnie 49% (2007 r.), co oznacza wzrost o prawie 1/3.

### IV. Przekraczanie progu nietrzeźwości (upijanie się)

Zestawiając wyniki tegorocznych badań z wynikami uzyskanymi w 1999 r. należy podkreślić istotne zmniejszenie się odsetka upijających się chłopców ze starszej frakcji wiekowej (uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych) – i to zarówno w okresie ostatniego roku, jak i w ciągu ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem

badania. Zmiany te można szacować w przedziale 20-25%. W badaniach zrealizowanych w 1999 r. w czasie ostatnich 12 miesięcy fakt upicia się zadeklarowało ponad 70% badanych chłopców zaś w tegorocznych badaniach było to 56% (2007 r.). Równie istotny spadek można zauważyć porównując tę samą grupę starszych chłopców i zestawiając ich deklaracje dot. upijania się w czasie ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem badania. W 1999 r. odnotowano 43% takich respondentów, zaś w 2007 r. 32%.

## V. Używanie substancji psychoaktywnych

Pierwszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w tej części badania jest wyraźny wzrost popularności leków uspokajających i nasennych branych bez przepisu lekarza. W grupie dziewcząt, uczennic III klas gimnazjów odsetek respondentek używających takich leków wzrósł w 2007 w porównaniu do wyników sprzed ośmiu lat (1999) o ponad 10% (z 9% do 20%). Nieco niższy, ale również wzrost odnotowano także wśród chłopców z tej samej frakcji wiekowej (z 3,3% w 1999 r. do 10,7% w 2007 r.). W starszej kohorcie badanych nie stwierdzono takich zmian, używanie leków uspokajających i nasennych było na zbliżonym poziomie, jak w roku 1999 r. a pewne przesunięcia (np. wśród dziewcząt) nie były istotne statystycznie.

W przypadku substancji nielegalnych (narkotyków) **odnotowano wyraźną różnicę w zakresie rozpowszechnienia używania amfetaminy w grupie chłopców uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych. Pomiędzy rokiem 1999 a 2007 nastąpił spadek sięgania po amfetaminę w tej grupie badanych** (z 12,7% w 1999 do 2,7% w 2007 r.). W innych badanych frakcjach nie stwierdzono poważniejszych zmian w tym zakresie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż inaczej sformułowane pytania dotyczące używania narkotyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w obydwu ww. ankietach) przyniosły daleko idące rozbieżności w oszacowaniu wielkości populacji takich uczniów. Należy jednak podkreślić, iż obie próbki chłopców – badanych „starą” i „nową” wersją ankiety nie różniły się istotnie od siebie. Badania zrealizowano w tych samych wylosowanych klasach, dając „starą” wersję ankiety, co trzeciemu uczniowi w klasie. Porównując obie te grupy nie odnotowano żadnej istotnej różnicy. Średnia ocen uzyskanych w szkole na koniec ostatniego półrocza, w obu badanych grupach była podobna (3,5 – dla uczniów badanych „starą wersją ankiety” i 3,4 – dla uczniów badanych „nową ankietą”). Również średnia liczba nieobecności w szkole podczas ostatnich 30 dni - spowodowanych wagarami – nie jest znacząco różna w obu badanych grupach.

Porównując wyniki badań z 1999 i 2007 roku dotyczących używania przez młodzież innych wymienionych w tab. 16a. i 16b. narkotyków (z wyjątkiem amfetaminy, o której piszemy powyżej) - nie odnotowano istotnych zmian w żadnej badanej grupie respondentów, tzn. stwierdzone różnice np. w używaniu marihuany w ciągu ostatnich 30 dni przez chłopców z II kl. szkół ponadgimnazjalnych nie są istotne statystycznie.

## VI. Ocena dostępności substancji psychoaktywnych

Jednym ze wskaźników weryfikujących poziom rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych jest subiektywna ocena dostępności narkotyków deklarowana przez młodzież. Potwierdzeniem istotnego zmniejszenia się populacji użytkowników amfetaminy wśród starszej grupy badanych chłopców jest **wyraźny spadek respondentów, którzy deklarują łatwość zdobycia amfetaminy** (suma odpowiedzi „raczej łatwe” i „bardzo łatwe”). **W 1999 r. prawie co trzeci (30,3%) badany uczeń z krakowskich gimnazjów (z III klas) uważał, że zdobycie amfetaminy byłoby dla niego łatwe, obecnie taką opinię ma już tylko co ósmy badany w tej grupie wiekowej (11,8%).**

Znaczący spadek w ocenie dostępności stwierdzono także w przypadku innego dość popularnego przed laty narkotyku, jakim jest ecstasy. W 1999 r. co czwarty uczeń (25,2%) III klasy gimnazjum deklarował, iż zdobycie tej substancji jest dla niego łatwe. Obecnie, jak wynika z badań zrealizowanych w 2007 r. taką opinię podziela już tylko niecałe 12% badanych.

Również w starszej grupie respondentów (uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych) odnotowano znaczący spadek młodzieży (choć nieco mniejszy, niż w populacji gimnazjalistów), która deklaruje łatwość zdobycia amfetaminy. W 1999 r. taką opinię prezentowało prawie 2/5 badanych (39,6%), obecnie – jak wynika z badań z 2007 r. – uważa tak, co czwarty uczeń krakowskich liceów i techników (z II klas).

## VII. Ocena dostępności papierosów.

Na szczególną uwagę zasługuje **istotna zmiana w dostępności papierosów dla młodzieży**. W opinii uczniów z III klas krakowskich gimnazjów (15-16 latków) papierosy przestało być tak łatwo dostępne, jak było to jeszcze osiem lat temu. W 1999 r. prawie 3/4 badanych respondentów w tej frakcji wiekowej (73%) uważało, iż zdobycie papierosów byłoby dla nich „bardzo łatwe, obecnie taki pogląd prezentuje mniej niż połowa badanych (49%).

Wyraźną zmianę w dostępności tytoniu potwierdzają także starsi badani uczniowie z II klas szkół ponadgimnazjalnych. W tej grupie badanych odsetek osób deklarujących „bardzo dużą łatwość” zdobycia papierosów zmniejszył się z 85% w 1999 r. do 70% w 2007 r.

## VIII. Ocena dostępności napojów alkoholowych.

**Istotną statystycznie różnicę odnotowano również w zakresie dostępności piwa.** Jak wynika z deklaracji uczestniczących w badaniu gimnazjalistów (z III klas) w 1999 r. prawie 2/3 spośród nich (64%) uważało wówczas, że piwo zdobyć „bardzo łatwo”. Obecnie jak pokazują badania z czerwca 2007 r. podobną opinię wyraża niecałe 46% badanych w tej grupie wiekowej. W przypadku pozostałych napojów alkoholowych różnice te są znacznie mniejsze

i nieistotne statystycznie. Także w starszej badanej grupie (III kl. szkół ponadgimnazjalnych) stwierdzono mniejszy niż w 1999 r. odsetek badanych, którzy uważają że „bardzo łatwo” byłoby im zdobyć piwo (spadek z 79% do 66%). W przypadku pozostałych napojów alkoholowych odnotowane różnice nie były statystycznie istotne.

#### **IX. Miejsca, gdzie można łatwo kupić marihuanę lub haszysz.**

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na opinie badanej młodzieży w sprawie miejsc, gdzie można kupić marihuanę lub haszysz, najpopularniejsze narkotyki używane przez młodzież. Również w tym zakresie odnotowano szereg istotnych i bardzo korzystnych zmian z punktu widzenia ograniczania dostępności narkotyków. Wyraźnie zwiększyła się populacja młodzieży, która przyznaje, że nie zna takich miejsc i odnotowano istotny statystycznie spadek respondentów, którzy jako takie miejsca wskazywali np. szkołę, ulicę czy dyskotekę. Wśród uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek tych, którzy twierdzili, że można łatwo kupić wspomniane narkotyki w szkole zmniejszył się z 33% w 1999 r. do 15% w 2007 r., a na ulicach z 36% (1999 r.) do 18% (2007 r.).

# PREZENTACJA WYNIKÓW

## 1. Palenie tytoniu

Tabela 1. Palenie tytoniu

poziom klasy		Palenie papierosów kiedykolwiek w życiu		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nigdy nie palił	32,8	49,4	52,4
	1-2 razy	14,4	12,6	15,5
	3-5 razy	7,2	5,5	6,5
	6-9 razy	4,9	5,5	4,0
	10-19 razy	4,9	3,6	5,8
	20-39 razy	5,6	4,3	3,8
	40 razy lub więcej	30,0	19,0	12,0
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nigdy nie palił	25,4	32,3	35,7
	1-2 razy	13,2	14,5	14,2
	3-5 razy	7,3	10,2	8,1
	6-9 razy	5,0	6,8	4,2
	10-19 razy	5,3	4,8	5,3
	20-39 razy	5,3	3,3	4,8
	40 razy lub więcej	38,5	28,1	27,7

Tabela 2a. Palenie tytoniu wśród chłopców

poziom klasy		Palenie papierosów kiedykolwiek w życiu		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nigdy nie palił	29,7	50,8	56,0
	1-2 razy	13,7	12,7	15,5
	3-5 razy	6,6	4,0	6,4
	6-9 razy	4,9	5,6	5,0
	10-19 razy	5,4	5,6	5,5
	20-39 razy	5,1	4,0	3,2
	40 razy lub więcej	34,6	17,5	8,5
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nigdy nie palił	22,3	32,6	31,3
	1-2 razy	12,5	13,7	13,5
	3-5 razy	6,1	13,1	9,0
	6-9 razy	4,5	5,1	3,7
	10-19 razy	6,1	5,0	4,3
	20-39 razy	5,1	2,6	4,9
	40 razy lub więcej	43,4	27,9	33,4

Tabela 2b. Palenie tytoniu wśród dziewcząt

poziom klasy		Palenie papierosów kiedykolwiek w życiu		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nigdy nie palił	36,7	48,0	49,1
	1-2 razy	15,4	12,6	15,6
	3-5 razy	7,9	7,1	6,5
	6-9 razy	5,0	5,5	3,3
	10-19 razy	4,5	1,6	6,0
	20-39 razy	6,1	4,7	4,3
	40 razy lub więcej	24,3	20,5	15,1
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nigdy nie palił	28,3	31,9	40,4
	1-2 razy	13,8	15,4	14,9
	3-5 razy	8,3	7,0	7,2
	6-9 razy	5,4	8,8	4,7
	10-19 razy	4,7	4,5	6,4
	20-39 razy	5,5	4,0	4,7
	40 razy lub więcej	34,1	28,4	21,7

Tabela 3. Palenie tytoniu w czasie ostatnich 30 dni

poziom klasy		Palenie papierosów w czasie 30 dni przed badaniem		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nie	62,6	76,1	82,2
	Mniej niż 1 papieros na tydzień	8,3	7,7	5,4
	Mniej niż 1 papieros dziennie	4,3	5,3	2,7
	1-5 papierosów dziennie	9,7	3,6	4,3
	6-10 papierosów dziennie	7,9	2,8	2,6
	11-20 papierosów dziennie	4,2	2,8	2,2
	Więcej niż 20 papierosów dziennie	3,0	1,6	0,7
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nie	57,0	65,0	63,4
	Mniej niż 1 papieros na tydzień	6,7	7,5	7,1
	Mniej niż 1 papieros dziennie	4,6	4,9	5,6
	1-5 papierosów dziennie	11,2	7,6	9,6
	6-10 papierosów dziennie	9,7	6,2	5,
	11-20 papierosów dziennie	7,6	6,2	6,5
	Więcej niż 20 papierosów dziennie	3,2	2,4	2,2

Tabela 4a. Palenie tytoniu w czasie ostatnich 30 dni wśród chłopców

poziom klasy		Palenie papierosów w czasie 30 dni przed badaniem		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nie	59,8	78,9	84,3
	Mniej niż 1 papieros na tydzień	7,4	6,5	5,8
	Mniej niż 1 papieros dziennie	4,6	4,9	2,9
	1-5 papierosów dziennie	9,3	3,3	2,6
	6-10 papierosów dziennie	9,2	4,1	1,5
	11-20 papierosów dziennie	5,7	2,4	2,3
	Więcej niż 20 papierosów dziennie	3,9	0,0	0,6
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nie	53,7	65,0	59,4
	Mniej niż 1 papieros na tydzień	6,9	5,6	5,4
	Mniej niż 1 papieros dziennie	3,8	7,5	5,0
	1-5 papierosów dziennie	9,5	7,5	10,6
	6-10 papierosów dziennie	11,6	4,0	7,5
	11-20 papierosów dziennie	11,2	6,7	9,3
	Więcej niż 20 papierosów dziennie	3,4	3,7	2,8

Tabela 4b. Palenie tytoniu w czasie ostatnich 30 dni wśród dziewcząt

poziom klasy		Palenie papierosów w czasie 30 dni przed badaniem		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nie	66,1	73,4	80,4
	Mniej niż 1 papieros na tydzień	9,2	8,9	5,0
	Mniej niż 1 papieros dziennie	3,9	5,6	2,5
	1-5 papierosów dziennie	10,1	4,0	5,8
	6-10 papierosów dziennie	6,6	1,6	3,5
	11-20 papierosów dziennie	2,4	3,2	2,0
	Więcej niż 20 papierosów dziennie	1,7	3,2	0,8
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nie	60,1	65,0	67,6
	Mniej niż 1 papieros na tydzień	6,4	9,8	8,9
	Mniej niż 1 papieros dziennie	5,3	2,0	6,2
	1-5 papierosów dziennie	12,8	7,8	8,6
	6-10 papierosów dziennie	8,1	8,8	3,5
	11-20 papierosów dziennie	4,4	5,7	3,5
	Więcej niż 20 papierosów dziennie	2,9	1,0	1,7

Picie napojów alkoholowych

Tabela 5. Picie napojów alkoholowych

poziom klasy		Picie napojów alkoholowych		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	89,2	85,0	82,9
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	79,7	75,6	72,5
	W czasie 30 dni przed badaniem	53,2	59,8	56,1
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	95,0	95,7	94,2
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	90,2	91,1	89,3
	W czasie 30 dni przed badaniem	71,7	80,4	85,2

Tabela 6a. Picie napojów alkoholowych wśród chłopców

poziom klasy		Picie napojów alkoholowych		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	90,4	87,3	78,9
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	82,1	77,8	66,5
	W czasie 30 dni przed badaniem	56,9	63,5	55,1
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	96,8	94,6	94,5
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	92,5	91,6	89,5
	W czasie 30 dni przed badaniem	77,7	84,5	88,4

Tabela 6b. Picie napojów alkoholowych wśród dziewcząt

poziom klasy		Picie napojów alkoholowych		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	87,9	82,7	86,2
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	76,8	73,4	77,7
	W czasie 30 dni przed badaniem	48,5	56,1	57,1
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	93,4	97,0	94,0
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	88,2	90,6	89,1
	W czasie 30 dni przed badaniem	66,2	75,8	81,8

Tabela 7. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem

poziom klasy		Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Picie piwa	54,5	49,2	47,4
	Picie wina	23,5	24,1	23,0
	Picie wódki	30,9	33,5	30,5
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Picie piwa	70,4	67,5	76,6
	Picie wina	31,2	31,9	38,7
	Picie wódki	46,7	54,4	58,5

Tabela 8a. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wśród chłopców

poziom klasy		Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Picie piwa	58,7	51,6	47,1
	Picie wina	24,9	28,6	22,5
	Picie wódki	36,2	39,7	33,1
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Picie piwa	77,7	73,1	81,4
	Picie wina	30,2	26,8	35,1
	Picie wódki	56,0	59,6	67,5

Tabela 8b. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wśród dziewcząt

poziom klasy		Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Picie piwa	49,4	46,8	47,9
	Picie wina	21,6	19,7	23,5
	Picie wódki	24,4	27,2	28,4
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Picie piwa	63,8	61,2	71,5
	Picie wina	31,7	37,7	42,4
	Picie wódki	38,3	48,5	48,8

Tabela 9. Przekraczanie progu nietrzeźwości

poziom klasy		Przekraczanie progu nietrzeźwości		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	55,1	49,0	39,3
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	46,1	43,8	31,8
	W czasie 30 dni przed badaniem	24,3	22,0	15,6
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	71,7	66,5	62,0
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	61,0	52,3	45,8
	W czasie 30 dni przed badaniem	34,3	30,7	27,1

Tabela 10a. Przekraczanie progu nietrzeźwości wśród chłopców

poziom klasy		Przekraczanie progu nietrzeźwości		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	61,7	52,0	37,5
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	53,0	46,4	30,3
	W czasie 30 dni przed badaniem	28,8	26,4	16,6
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	79,8	72,7	70,9
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	70,4	55,9	55,1
	W czasie 30 dni przed badaniem	43,2	31,5	38,2

Tabela 10b. Przekraczanie progu nietrzeźwości wśród dziewcząt

poziom klasy		Przekraczanie progu nietrzeźwości		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	47,3	46,0	40,9
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	37,8	41,3	33,2
	W czasie 30 dni przed badaniem	18,5	17,6	14,7
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	64,5	59,6	52,5
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	52,5	48,2	36,0
	W czasie 30 dni przed badaniem	26,2	29,8	15,1

Tabela 11. Picie nadmierne w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem

poziom klasy		Wypicie 5 lub więcej drinków z rzędu w czasie ostatnich 30 dni		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Ani razu	58,5	X	66,3
	1 raz	14,5	X	11,2
	2 razy	9,7	X	8,5
	3-5 razy	9,2	X	7,9
	6-9 razy	3,8	X	3,1
	10 lub więcej razy	4,3	X	3,0
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Ani razu	46,9	X	42,4
	1 raz	15,9	X	18,3
	2 razy	12,2	X	13,5
	3-5 razy	13,7	X	14,0
	6-9 razy	5,1	X	6,1
	10 lub więcej razy	6,1	X	5,6

## 2. Używanie innych substancji psychoaktywnych

Tabela 12. Potencjalny popyt na narkotyki

poziom klasy		Chęć spróbowania narkotyku lub leku		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Tak	29,1	25,9	X
	Nie	70,9	74,1	X
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Tak	39,3	34,7	X
	Nie	60,7	65,3	X

Tabela 13. Używanie substancji kiedykolwiek w życiu

poziom klasy		Używanie substancji kiedykolwiek w życiu		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	18,7	20,3	18,9
	Substancje wziewne	12,8	11,5	5,8
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	18,8	19,0	16,0
	Amfetamina	8,9	6,9	6,1
	LSD lub inne halucynogeny	5,3	6,1	5,8
	Crack	2,0	5,6	3,6
	Kokaina	3,3	6,1	4,2
	Relevin	1,4	4,5	3,5
	Heroina	11,2	4,9	3,4
	Ecstasy	4,9	0,0	4,9
	Grzyby halucynogenne	5,7	5,6	4,4
	GHB	X	5,6	2,0
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	1,6	5,2	2,8
	Alkohol razem z tabletkami	11,2	8,0	6,2
	Alkohol razem z marihuaną	10,9	X	X
	Sterydy anaboliczne	3,5	6,8	3,0
Polska heroina (kompot)	X	6,0	4,3	
Drugie klasy szkół pogimnazjal- nych	Marihuana lub haszysz	27,2	26,8	32,7
	Substancje wziewne	7,4	8,7	11,8
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	23,2	17,7	24,9
	Amfetamina	12,8	7,1	14,7
	LSD lub inne halucynogeny	4,8	5,2	9,8
	Crack	1,5	5,7	10,4
	Kokaina	2,5	6,6	11,5
	Relevin	,4	4,5	9,0
	Heroina	8,3	5,2	8,6
	Ecstasy	3,7	X	14,6
	Grzyby halucynogenne	4,2	6,1	10,0
	GHB	X	4,0	9,6
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	,5	5,1	9,2
	Alkohol razem z tabletkami	16,7	9,6	12,9
	Alkohol razem z marihuaną	16,4	X	X
	Sterydy anaboliczne	2,9	6,8	10,0
Polska heroina (kompot)	X	4,9	8,9	

Tabela 14a. Używanie substancji chociaż raz w życiu wśród trzecich klas gimnazjum

poziom klasy		Używanie substancji chociaż raz w życiu					
		Chłopcy			Dziewczęta		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta	1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	24,2	22,6	21,6	12,2	18,1	16,7
	Substancje wziewne	15,3	10,4	7,0	9,7	12,6	4,8
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	13,2	14,5	8,5	25,2	23,4	22,3
	Amfetamina	11,5	8,9	7,3	5,7	4,8	5,1
	LSD lub inne halucynogeny	7,6	7,3	5,2	2,6	4,8	6,3
	Crack	3,3	7,3	5,6	,6	4,0	2,0
	Kokaina	4,8	8,9	5,0	1,6	3,3	3,5
	Relevin	2,1	6,5	5,8	,4	2,5	1,5
	Heroina	14,5	6,5	3,2	7,2	3,3	3,5
	Ecstasy	6,5	X	6,2	2,8	X	3,8
	Grzyby halucynogenne	8,6	7,1	5,2	2,2	4,0	3,8
	GHB	X	7,2	3,5	X	4,0	0,8
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	2,4	6,4	3,5	,7	4,0	2,3
	Alkohol razem z tabletkami	9,8	5,6	5,5	12,4	10,3	6,8
	Alkohol razem z marihuaną	14,9	X	X	6,1	X	X
Sterydy anaboliczne	6,0	9,6	5,2	,4	4,0	1,0	
Polska heroina (kompot)	X	8,7	5,8	X	3,2	3,0	

Tabela 14b. Używanie substancji chociaż raz w życiu wśród drugich klas szkół pogimnazjalnych

poziom klasy		Używanie substancji chociaż raz w życiu					
		Chłopcy			Dziewczęta		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta	1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	36,5	34,1	41,6	18,9	18,6	23,5
	Substancje wziewne	8,7	9,7	18,0	6,2	7,6	5,2
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	15,0	13,2	23,5	30,3	22,6	26,4
	Amfetamina	16,0	6,7	20,7	9,8	7,5	8,4
	LSD lub inne halucynogeny	7,2	6,0	14,4	2,6	4,4	4,9
	Crack	2,4	7,1	16,9	,8	4,2	3,5
	Kokaina	4,5	8,7	17,5	,7	4,2	5,0
	Relevin	,8	5,6	14,8	,1	3,2	3,0
	Heroina	11,6	6,2	13,1	5,2	4,2	3,9
	Ecstasy	5,1	X	23,0	2,3	X	5,9
	Grzyby halucynogenne	6,9	7,3	16,2	1,6	4,8	3,4
	GHB	X	4,8	16,2	X	3,1	2,5
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	,8	5,2	14,8	,2	5,1	3,3
	Alkohol razem z tabletkami	13,0	6,4	17,0	19,8	13,3	8,4
	Alkohol razem z marihuaną	22,2	X	X	11,1	X	X
	Sterydy anaboliczne	5,6	10,0	17,4	.6	3,1	2,2
Polska heroina (kompot)	X	5,4	14,2	X	4,4	3,2	

Tabela 15a. Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy w trzecich klasach gimnazjum.

poziom klasy		Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	15,9	15,7	14,1
	Substancje wziewne	6,0	7,5	4,9
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	6,0	15,0	X
	Amfetamina	7,3	6,7	4,5
	LSD lub inne halucynogeny	3,8	6,9	X
	Crack	X	4,3	X
	Kokaina	2,9	5,0	X
	Relevin	X	3,5	X
	Heroina	3,3	5,1	X
	Ecstasy	x	5,4	4,0
	Grzyby halucynogenne	X	5,1	X
	GHB	X	4,7	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	5,4	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	7,0	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	11,2	X
	Sterydy anaboliczne	2,6	4,7	X
Polska heroina (kompot)	X	5,0	X	

Tabela 15b. Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy w trzech klasach gimnazjum.

poziom klasy		Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	21,7	20,1	26,1
	Substancje wziewne	2,3	6,0	10,6
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	7,9	10,9	X
	Amfetamina	9,4	3,0	12,4
	LSD lub inne halucynogeny	3,7	4,0	X
	Crack	X	6,3	X
	Kokaina	2,2	5,9	X
	Relevin	X	3,9	X
	Heroina	2,2	3,4	X
	Ecstasy	X	4,4	11,6
	Grzyby halucynogenne	X	4,7	X
	GHB	X	2,5	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	5,0	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	7,2	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	7,5	X
Sterydy anaboliczne	2,7	3,6	X	
Polska heroina (kompot)	X	5,2	X	

Tabela 16a. Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy wśród trzecich klas gimnazjum wg płci

poziom klasy		Chłopcy			Dziewczęta		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta	1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	20,7	15,2	15,2	10,3	16,1	13,2
	Substancje wziewne	7,1	8,7	6,1	4,7	6,3	3,8
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	3,3	10,7	X	9,0	19,5	X
	Amfetamina	8,3	6,9	5,0	6,1	6,5	4,0
	LSD lub inne halucynogeny	4,4	6,9	X	2,9	7,0	X
	Crack	X	6,1	X	X	2,4	X
	Kokaina	3,5	6,1	X	2,3	4,0	X
	Relevin	X	5,3	X	X	1,6	X
	Heroina	4,2	6,1	X	2,2	4,0	X
	Ecstasy	X	6,8	5,0	X	4,0	3,3
	Grzyby halucynogenne	X	6,1	X	X	4,0	X
	GHB	X	6,1	X	X	3,2	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	6,9	X	X	4,0	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	5,3	X	X	8,7	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	12,9	X	X	9,5	X
Sterydy anaboliczne	3,9	6,8	X	1,2	2,4	X	
Polska heroina (kompot)	X	6,1	X	X	3,9	X	

Tabela 16b. Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy wśród drugich klas szkół pogimnazjalnych wg płci

poziom klasy		Chłopcy			Dziewczęta		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta	1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy szkół ponad- gimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	30,9	26,2	34,8	13,4	13,3	17,1
	Substancje wziewne	3,0	7,3	17,3	1,7	4,6	3,4
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	4,6	6,6	X	10,7	15,7	X
	Amfetamina	12,7	2,7	18,9	6,6	3,4	5,5
	LSD lub inne halucynogeny	5,7	4,2	X	1,9	3,8	X
	Crack	X	8,9	X	X	3,4	X
	Kokaina	3,8	9,0	X	0,7	2,4	X
	Relevin	X	4,8	X	X	2,9	X
	Heroina	3,8	3,9	X	0,7	2,9	X
	Ecstasy	X	5,3	18,3	X	3,4	4,6
	Grzyby halucynogenne	X	6,9	X	X	2,1	X
	GHB	X	2,0	X	X	3,1	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	5,6	X	X	4,3	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	5,0	X	X	9,6	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	9,3	X	X	5,3	X
Sterydy anaboliczne	4,9	4,8	X	0,8	2,1	X	
Polska heroina (kompot)	X	6,2	X	X	4,1	X	

Tabela 17a. Używanie poszczególnych substancji w czasie ostatnich 30 dni wśród trzecich klas gimnazjum

poziom klasy		Podział ze względu na klasę		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	10,3	9,2	6,1
	Substancje wziewne	3,0	7,2	4,1
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	3,8	8,3	X
	Amfetamina	4,3	4,3	3,1
	LSD lub inne halucynogeny	2,7	3,5	X
	Crack	X	3,1	X
	Kokaina	2,1	3,1	X
	Relevin	X	2,7	X
	Heroina	2,5	2,3	X
	Ecstasy	X	3,5	3,2
	Grzyby halucynogenne	X	3,1	X
	GHB	X	2,7	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	4,3	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	3,5	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	7,8	X
	Sterydy anaboliczne	2,3	3,9	X
	Polska heroina (kompot)	X	2,7	X

Tabela 17b. Używanie poszczególnych substancji w czasie ostatnich 30 dni wśród drugich klas szkół pogimnazjalnych

poziom klasy		Podział ze względu na klasę		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	12,6	9,7	15,3
	Substancje wziewne	0,9	4,4	9,3
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	4,1	5,2	X
	Amfetamina	4,3	1,9	11,5
	LSD lub inne halucynogeny	2,2	1,5	X
	Crack	X	1,8	X
	Kokaina	1,4	2,8	X
	Relevin	X	2,7	X
	Heroina	1,4	1,2	X
	Ecstasy	X	2,0	9,9
	Grzyby halucynogenne	X	1,6	X
	GHB	X	2,5	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	2,2	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	1,9	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	2,6	X
	Sterydy anaboliczne	1,8	3,4	X
Polska heroina (kompot)	X	3,5	X	

Tabela 18a. Używanie substancji w czasie ostatnich 30 dni wśród trzecich klas gimnazjum (wg płci)

poziom klasy		Podział ze względu na płeć					
		Chłopcy			Dziewczęta		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta	1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	14,6	9,6	7,9	5,2	8,9	4,5
	Substancje wziewne	3,5	7,1	5,3	2,4	7,3	3,0
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	2,4	6,1	X	5,4	10,6	X
	Amfetamina	5,1	3,8	3,8	3,1	4,9	2,5
	LSD lub inne halucynogeny	3,4	3,8	X	1,9	3,1	X
	Crack	X	4,6	X	X	1,6	X
	Kokaina	2,5	3,8	X	1,6	2,4	X
	Relevin	X	4,5	X	X	0,8	X
	Heroina	3,1	3,0	X	1,7	1,6	X
	Ecstasy	X	4,5	4,7	X	2,4	2,0
	Grzyby halucynogenne	X	4,6	X	X	1,6	X
	GHB	X	3,0	X	X	2,4	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	5,3	X	X	3,2	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	4,6	X	X	2,4	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	9,1	X	X	6,3	X
	Sterydy anaboliczne	3,1	6,1	X	1,2	1,6	X
Polska heroina (kompot)	X	2,3	X	X	3,1	X	

Tabela 18b. Używanie substancji w czasie ostatnich 30 dni wśród drugich klas szkół pogimnazjalnych (wg płci)

poziom klasy		Podział ze względu na płeć					
		Chłopcy			Dziewczęta		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta	1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	20,6	12,7	22,4	5,3	6,3	8,0
	Substancje wziewne	1,7	5,7	15,4	,3	3,0	2,9
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	2,6	4,0	X	5,3	6,7	X
	Amfetamina	6,6	1,2	18,8	2,2	2,8	3,8
	LSD lub inne halucynogeny	3,8	2,0	X	0,7	1,0	X
	Crack	X	3,3	X	X	0,0	X
	Kokaina	2,5	4,8	X	0,4	0,4	X
	Relevin	X	3,6	X	X	1,6	X
	Heroina	2,3	1,2	X	0,5	1,3	X
	Ecstasy	X	1,7	16,1	X	2,4	3,5
	Grzyby halucynogenne	X	1,2	X	X	2,1	X
	GHB	X	2,0	X	X	3,1	X
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	X	2,6	X	X	1,7	X
	Alkohol razem z tabletkami	X	1,2	X	X	2,7	X
	Alkohol razem z marihuaną	X	2,3	X	X	2,9	X
	Sterydy anaboliczne	3,4	4,8	X	0,3	1,7	X
Polska heroina (kompot)	X	5,0	X	X	1,8	X	

Tabela 19. Używanie leków z przepisu lekarza

poziom klasy		Używanie kiedykolwiek leków uspokajających lub nasennych z przepisu lekarza		
		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nie, nigdy	86,9	81,5	86,8
	Tak, ale krócej niż przez trzy tygodnie	10,9	14,1	10,3
	Tak, przez trzy tygodnie lub dłużej	2,1	4,4	2,8
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nie, nigdy	86,1	81,9	82,1
	Tak, ale krócej niż przez trzy tygodnie	11,2	12,5	13,0
	Tak, przez trzy tygodnie lub dłużej	2,7	5,6	4,9

### 3. Problemy związane z używaniem substancji

Tabela 20a. Doświadczania poszczególnych problemów związanych z alkoholem kiedykolwiek w życiu wśród uczniów trzecich klas gimnazjum.

		Tak, z powodu alkoholu		
poziom klasy		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kłótnia lub sprzeczka	9,5	11,7	X
	Przepychanka lub bójka	6,9	7,5	9,1
	Wypadek lub uszkodzenie ciała	4,7	6,3	11,3
	Utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów	4,2	5,5	X
	Zniszczenie rzeczy lub ubrania	8,9	7,9	X
	Problemy z rodzicami	9,7	7,9	13,7
	Problemy z przyjaciółmi	5,7	7,9	10,0
	Problemy z nauczycielami	3,2	4,8	X
	Gorsze wyniki w nauce lub w pracy	3,4	7,6	10,0
	Stałeś się ofiarą rabunku lub kradzieży	1,5	2,8	4,7
	Kłopoty z policją	4,1	X	8,0
	Interwencja pogotowia ratunkowego	1,5	X	4,5
	Niechciane przez Ciebie doświadczenia seksualne	3,9	X	6,0
	Seks bez zabezpieczenia (bez antykoncepcji)	4	X	8,7

Tabela 20b. Doświadczania poszczególnych problemów związanych z alkoholem kiedykolwiek w życiu wśród uczniów drugich klas szkół pogimnazjalnych.

		Tak, z powodu alkoholu		
poziom klasy		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kłótnia lub sprzeczka	16,8	18,3	X
	Przepychanka lub bójka	12,5	9,9	22,0
	Wypadek lub uszkodzenie ciała	7,8	9,2	21,8
	Utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów	5,9	6,3	X
	Zniszczenie rzeczy lub ubrania	14,1	12,6	X
	Problemy z rodzicami	15	11,5	23,3
	Problemy z przyjaciółmi	7	5,8	18,5
	Problemy z nauczycielami	2,4	4,3	X
	Gorsze wyniki w nauce lub w pracy	4,8	6,4	24,9
	Stałeś się ofiarą rabunku lub kradzieży	1,5	5,6	12,0
	Kłopoty z policją	4,6	X	18,2
	Interwencja pogotowia ratunkowego	1,4	X	10,6
	Niechciane przez Ciebie doświadczenia seksualne	7,4	X	13,5
	Seks bez zabezpieczenia (bez antykoncepcji)	6,1	X	17,5

Tabela 21. Doświadczania poszczególnych problemów związanych z narkotykami kiedykolwiek w życiu

		Tak, z powodu narkotyków		
poziom klasy		2005	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Kłótnia lub sprzeczka	2,4	2,3	X
	Przepychanka lub bójka	1,2	2,8	4,3
	Wypadek lub uszkodzenie ciała	0,7	2,7	4,5
	Utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów	0,8	3,5	X
	Zniszczenie rzeczy lub ubrania	0,9	2,4	X
	Problemy z rodzicami	2,0	3,6	3,4
	Problemy z przyjaciółmi	2,1	3,6	3,4
	Problemy z nauczycielami	1,2	4,0	X
	Gorsze wyniki w nauce lub w pracy	1,6	2,0	4,7
	Stałeś się ofiarą rabunku lub kradzieży	0,8	4,0	2,3
	Kłopoty z policją	1,3	X	3,0
	Interwencja pogotowia ratunkowego	0,5	X	3,0
	Niechciane przez Ciebie doświadczenia seksualne	0,9	X	3,0
	Seks bez zabezpieczenia (bez antykoncepcji)	1,1	X	4,5
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kłótnia lub sprzeczka	2,6	3,9	X
	Przepychanka lub bójka	0,7	2,9	10,6
	Wypadek lub uszkodzenie ciała	0,4	2,7	9,9
	Utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów	0,9	1,3	X
	Zniszczenie rzeczy lub ubrania	0,9	0,7	X
	Problemy z rodzicami	1,7	1,5	10,2
	Problemy z przyjaciółmi	1,9	2,9	11,4
	Problemy z nauczycielami	1,1	2,3	X
	Gorsze wyniki w nauce lub w pracy	2,4	2,0	12,9
	Stałeś się ofiarą rabunku lub kradzieży	0,2	3,0	9,9
	Kłopoty z policją	0,6	X	9,9
	Interwencja pogotowia ratunkowego	0,4	X	10,7
	Niechciane przez Ciebie doświadczenia seksualne	0,9	X	10,8
	Seks bez zabezpieczenia (bez antykoncepcji)	1,0	X	10,6

#### 4. Dostępność substancji psychoaktywnych

Tabela 23a. Ocena dostępności poszczególnych substancji wśród trzecich klas gimnazjum

poziom klasy			Nie możliwe	Bardzo trudne	Dosyć trudne	Dosyć łatwe	Bardzo łatwe	Nie wiem
Trzecie klasy gimnazjum	Papierosy	1999	3,3	1,1	2,0	16,8	72,6	4,2
		2007 stara ankieta	10,1	3,1	5,4	21,0	48,6	11,7
		2007 nowa ankieta	3,1	1,8	6,1	31,2	49,1	8,7
	Piwo	1999	2,8	1,3	4,3	24	63,7	3,9
		2007 stara ankieta	8,1	3,9	7,4	24,4	45,7	10,5
		2007 nowa ankieta	4,0	3,2	7,3	28,2	50,6	6,6
	Wino	1999	4,1	2,7	10,3	25,7	49,9	7,4
		2007 stara ankieta	8,8	7,3	10,4	20,8	40,4	12,3
		2007 nowa ankieta	4,9	3,8	13,2	29,5	39,7	8,9
	Wódka	1999	6,3	7,1	17	21,1	40,9	7,6
		2007 stara ankieta	9,7	8,2	10,5	24,1	33,1	14,4
		2007 nowa ankieta	7,0	7,2	18,2	25,5	29,7	12,4
	Marihuana lub haszysz	1999	15,1	13	17,3	18,3	17,9	18,4
		2007 stara ankieta	18,5	13,9	15,8	13,9	10,4	27,4
		2007 nowa ankieta	14,8	11,2	16,4	22,6	17,2	17,8
	LSD lub inny środek halucynogeny	1999	16,7	14,9	19,2	15,1	10,6	23,5
		2007 stara ankieta	19,4	16,3	17,8	7,0	7,0	32,6
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Amfetamina	1999	16,0	15,0	16,6	16,8	14,1	21,5
		2007 stara ankieta	20,2	17,8	16,6	5,7	6,1	33,6
		2007 nowa ankieta	26,5	16,6	13,0	15,2	9,3	19,4
	Leki uspokajające lub nasenne	1999	11,6	9,6	16,5	19,6	21,4	21,3
		2007 stara ankieta	17,9	12,3	15,1	10,3	13,1	31,3
		2007 nowa ankieta	17,4	8,4	10,4	27,2	19,2	17,4
Crack	1999	17,8	17,2	16,4	10,4	7,4	30,6	
	2007 stara ankieta	23,2	14,3	13,9	6,2	6,6	35,9	
	2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X	

Tabela 23a. Ocena dostępności poszczególnych substancji wśród trzecich klas gimnazjum

poziom klasy			Nie możliwe	Bardzo trudne	Dosyć trudne	Dosyć łatwe	Bardzo łatwe	Nie wiem
Trzecie klasy gimnazjum	Kokaina	1999	17,9	17,8	17,0	12,0	9,8	25,5
		2007 stara ankieta	21,3	16,1	15,4	5,9	7,1	34,3
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Ecstasy	1999	17,2	16,5	16,2	13,9	11,3	25
		2007 stara ankieta	21,9	15,9	14,7	6,4	5,2	35,9
		2007 nowa ankieta	26,7	15,2	13,4	13,8	9,9	21,1
	Heroina	1999	17,9	18,0	16,8	12,3	9,8	25,2
		2007 stara ankieta	20,9	17,4	15,1	5,4	6,2	34,9
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Grzyby halucynogenne	1999	16,9	15,1	16,1	12,7	13	26
		2007 stara ankieta	21,0	15,6	15,6	5,4	7,4	35,0
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	GHB	1999	X	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	20,6	14,0	16,3	5,1	6,2	37,7
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Substancje wziewne	1999	12,8	9,9	10,6	14,8	31,4	20,5
		2007 stara ankieta	16,7	12,7	11,6	6,4	21,9	30,7
		2007 nowa ankieta	22,0	10,0	9,3	18,2	20,1	20,5
	Sterydy anaboliczne	1999	16,8	14,5	14,6	12,0	12,6	29,6
		2007 stara ankieta	21,7	16,7	10,1	5,8	7,8	38,0
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
Polska heroina (kompot)	1999	X	X	X	X	X	X	
	2007 stara ankieta	21,2	17,8	10,0	6,6	7,3	37,1	
	2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X	

Tabela 23b Ocena dostępności poszczególnych substancji wśród uczniów drugich klas ponadgimnazjalnych

poziom klasy			Nie możliwe	Bardzo trudne	Dosyć trudne	Dosyć łatwe	Bardzo łatwe	Nie wiem
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Papierosy	1999	1,6	0,4	0,7	10,1	85,2	1,9
		2007 stara ankieta	7,4	2,5	2,4	13,2	67,9	6,6
		2007 nowa ankieta	2,5	1,0	3,1	16,2	68,5	8,6
	Piwo	1999	1,1	0,4	1,7	16,7	78,7	1,4
		2007 stara ankieta	7,5	0,8	3,9	15,1	66,0	6,7
		2007 nowa ankieta	2,9	1,7	2,2	17,7	70,9	4,8
	Wino	1999	1,7	1,1	4,2	20	69,1	3,9
		2007 stara ankieta	6,6	3,2	2,5	18,3	61,2	8,1
		2007 nowa ankieta	3,4	2,8	4,4	19,5	63,9	5,9
	Wódka	1999	2,2	2,6	9,5	22,5	59	4,2
		2007 stara ankieta	7,7	2,6	5,7	18,1	57,6	8,4
		2007 nowa ankieta	3,2	3,9	5,6	22,9	58,1	6,3
	Marihuana lub haszysz	1999	8,5	8,8	16,9	26,6	20	19,3
		2007 stara ankieta	13,2	9,6	10,8	22,8	14,8	28,7
		2007 nowa ankieta	11,9	8,0	16,5	29,1	18,3	16,2
	LSD lub inny środek halucynogeny	1999	9,7	11,8	22,0	20,6	10,3	25,6
		2007 stara ankieta	13,9	14,3	14,4	14,1	8,5	34,9
		2007 nowa ankieta	13,9	14,3	14,4	14,1	8,5	34,9
	Amfetamina	1999	9,2	10,7	18,6	23,0	16,6	21,9
		2007 stara ankieta	14,3	16,7	10,0	14,9	10,0	34,1
		2007 nowa ankieta	20,2	14,5	17,8	20,2	8,4	19,0
	Leki uspokajające lub nasenne	1999	6,1	7,1	14,6	26,2	23,3	22,8
		2007 stara ankieta	11,7	11,5	11,0	19,4	15,7	30,8
		2007 nowa ankieta	13,6	9,8	15,8	28,1	17,8	14,9
	Crack	1999	10,7	15,2	19,3	11,2	6,5	37,1
		2007 stara ankieta	18,9	15,0	13,1	6,8	7,3	38,7
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X

Tabela 23b Ocena dostępności poszczególnych substancji wśród uczniów drugich klas ponadgimnazjalnych

poziom klasy			Nie możliwe	Bardzo trudne	Dosyć trudne	Dosyć łatwe	Bardzo łatwe	Nie wiem
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Kokaina	1999	11,0	15,9	22,1	12,9	7,5	30,5
		2007 stara ankieta	17,9	15,3	10,8	13,7	7,2	35,1
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Ecstasy	1999	10,6	13,9	18,8	17,0	10,2	29,5
		2007 stara ankieta	17,7	14,8	11,2	11,5	10,7	34,0
		2007 nowa ankieta	19,4	12,6	16,6	20,8	10,1	20,4
	Heroina	1999	11,7	15,9	20,9	13,2	8,1	30,2
		2007 stara ankieta	17,9	16,3	11,6	10,0	8,2	36,1
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Grzyby halucynogenne	1999	10,4	12,9	18,1	16,8	12,1	29,8
		2007 stara ankieta	18,6	15,4	11,4	10,3	7,5	36,8
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	GHB	1999	X	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	18,7	14,6	9,1	10,6	5,8	41,1
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
	Substancje wziewne	1999	7,5	7,1	9,9	18,0	34,9	22,6
		2007 stara ankieta	14,7	10,9	9,0	12,3	21,3	31,7
		2007 nowa ankieta	17,1	10,8	11,8	20,5	19,9	19,9
	Sterydy anaboliczne	1999	11,1	11,3	15,9	15,2	13,6	33
		2007 stara ankieta	17,8	14,5	11,0	11,1	10,0%	35,6
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X
Polska heroina (kompot)	1999	X	X	X	X	X	X	
	2007 stara ankieta	16,8	17,6	10,5	9,3	6,5	39,2	
	2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X	X	

Tabela 24a. Ekspozycja na propozycje poszczególnych substancji wśród uczniów trzecich klas gimnazjum

poziom klasy		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Piwo	79,4	65,7	X
	Wino	50,1	45,9	X
	Wódka	53,0	48,6	X
	Marihuana lub haszysz	23,1	23,0	X
	LSD	7,1	11,0	X
	Amfetamina	13,6	11,2	X
	Leki uspokajające lub nasenne	7,4	12,1	X
	Crack	3,9	9,2	X
	Kokaina	6,4	11,4	X
	Ecstasy	7,5	11,2	X
	Heroina	6,8	9,8	X
	Sterydy anaboliczne	6,4	11,0	X
	Polska heroina (kompot)	5,2	9,6	X
	Bimber	15,3	15,3	X

Tabela 24b. Ekspozycja na propozycje poszczególnych substancji wśród drugich klas ponadgimnazjalnych

poziom klasy		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Drugie klasy ponadgimnazjalne	Piwo	92,4	80,5	X
	Wino	64,8	58,5	X
	Wódka	77,4	69,3	X
	Marihuana lub haszysz	32,6	25,0	X
	LSD	7,3	10,3	X
	Amfetamina	16,6	8,4	X
	Leki uspokajające lub nasenne	7,2	10,2	X
	Crack	2,7	9,5	X
	Kokaina	4,7	10,1	X
	Ecstasy	7,4	11,4	X
	Heroina	4,4	10,1	X
	Sterydy anaboliczne	6,8	10,6	X
	Polska heroina (kompot)	2,0	10,1	X
	Bimber	19,3	22,6	X



Tabela 25. Miejsca gdzie łatwo kupić marihuanę lub haszysz

poziom klasy		1999	2007 stara ankieta	2007 nowa ankieta
Trzecie klasy gimnazjum	Nie znam takich miejsc	43,5	64,3	55,1
	Ulica, park	28,4	11,5	21,8
	Szkoła	23,4	8,3	14,5
	Dyskoteka, bar	29,0	12,3	17,6
	Mieszkanie dealera	22,3	X	X
	Internet	X	11,5	10,0
	Inne miejsce	10,0	13,5	21,8
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Nie znam takich miejsc	35,0	51,1	49,8
	Ulica, park	36,3	17,6	19,4
	Szkoła	33,2	14,5	15,1
	Dyskoteka, bar	42,0	27,2	24,4
	Mieszkanie dealera	24,7	X	X
	Internet	X	14,2	8,6
	Inne miejsce	8,6	17,6	21,1



## 5. Ryzyko związane z używaniem substancji psychoaktywnych w opiniach badanych

Tabela 26. Ocena ryzyka związanego z używaniem poszczególnych substancji wśród uczniów trzecich klas gimnazjum.

poziom klasy			Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
Trzecie klasy gimnazjum	Pałą papierosy od czasu do czasu	1999	12,7	43,2	27,3	11,0	5,9
		2007 stara ankieta	15,4	24,7	33,2	18,9	7,7
		2007 nowa ankieta	14,0	31,8	29,3	17,3	7,7
	Wypalają co najmniej paczkę papierosów dziennie	1999	2,7	5,8	17,3	69,9	4,3
		2007 stara ankieta	9,8	3,1	12,5	66,7	7,8
		2007 nowa ankieta	8,1	5,9	15,3	61,5	9,2
	Wypijają 1 lub 2 drinki prawie codziennie	1999	9,2	22,5	30,3	31,4	6,7
		2007 stara ankieta	12,5	17,1	26,1	33,5	10,9
		2007 nowa ankieta	11,4	17,7	26,2	33,1	11,6
	Wypijają 4 lub 5 drinków prawie codziennie	1999	4,3	8,4	20,4	61,6	5,2
		2007 stara ankieta	8,7	5,9	9,8	63,0	12,6
		2007 nowa ankieta	8,0	6,2	17,6	56,0	12,2
	Wypijają 5 drinków lub więcej w czasie weekendu	1999	5,3	12,4	26,2	48,1	8
		2007 stara ankieta	9,7	14,8	23,7	38,1	13,6
		2007 nowa ankieta	9,8	8,1	24,0	45,8	12,2
	Próbują 1 raz lub 2 razy marihuany lub haszyszu	1999	9,8	16,3	19,5	45,8	8,6
		2007 stara ankieta	16,7	14,8	17,1	37,0	14,4
		2007 nowa ankieta	13,4	17,2	20,4	37,1	11,8
	Pałą marihuanę lub haszysz od czasu do czasu	1999	6,4	11,7	23,4	49,8	8,7
		2007 stara ankieta	10,9	10,5	19,4	46,1	13,2
		2007 nowa ankieta	11,8	10,9	21,0	43,3	13,0
	Pałą marihuanę lub haszysz regularnie	1999	3,2	3,3	8,3	78,3	7
		2007 stara ankieta	9,0	5,5	7,8	58,6	19,1
		2007 nowa ankieta	9,4	3,5	9,4	62,8	14,8

poziom klasy			Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
Trzecie klasy gimnazjum	Próbują 1 raz lub 2 razy LSD	1999	4,7	11	22,5	48,1	13,7
		2007 stara ankieta	9,1	11,5	17,4	37,5	24,5
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą LSD regularnie	1999	2,0	2,3	4,7	80,1	10,8
		2007 stara ankieta	X	X	X	X	X
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy amfetaminę	1999	5,6	12,2	23,9	47,5	10,9
		2007 stara ankieta	9,5	8,7	14,6	47,0	20,2
		2007 nowa ankieta	8,9	7,8	24,0	43,8	15,5
	Biorą amfetaminę regularnie	1999	1,9	2,1	5,4	82,2	8,4
		2007 stara ankieta	8,2	5,1	4,7	62,3	19,8
		2007 nowa ankieta	8,9	3,5	5,2	66,4	15,9
	Próbują 1 raz lub 2 razy kokainy	1999	3,9	8,9	23,1	52,5	11,6
		2007 stara ankieta	11,2	7,8	15,5	43,4	22,1
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą kokainę regularnie	1999	1,8	1,5	4,4	83,7	8,6
		2007 stara ankieta	7,5	2,4	4,3	63,4	22,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy crack	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	9,1	7,9	13,8	43,5	25,7
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą crack regularnie	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	7,4	2,3	5,5	59,4	25,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy ecstasy	1999	5,3	10,8	23,4	47,3	13,1
		2007 stara ankieta	8,9	8,6	16,7	39,3	26,5
		2007 nowa ankieta	9,4	10,6	22,6	40,0	17,4
	Biorą ecstasy regularnie	1999	2,3	2,4	5,9	79,2	10,3
		2007 stara ankieta	7,1	3,1	6,7	59,4	23,6
		2007 nowa ankieta	7,8	4,5	7,5	63,4	16,8

poziom klasy			Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
Trzecie klasy gimnazjum	Próbują 1 raz lub 2 razy GHB	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	11,3	6,6	12,8	35,8	33,5
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą GHB regularnie	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	8,2	2,4	3,5	54,9	31,0
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy narkotyki w zastrzykach	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	8,7	4,7	13,8	52,8	20,1
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą narkotyki w zastrzykach regularnie	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	8,3	2,8	4,0	65,6	19,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy środków wziewnych	1999	4,3	10,9	22,9	47,9	13,9
		2007 stara ankieta	10,1	9,7	16,7	37,7	25,7
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą środki wziewne regularnie	1999	2,2	1,9	6,4	78,3	11,2
		2007 stara ankieta	10,4	3,1	5,0	58,3	23,2
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X

Tabela 26b. Ocena ryzyka związanego z używaniem poszczególnych substancji wśród uczniów drugich klas ponadgimnazjalnych.

poziom klasy			Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Pałą papierosy od czasu do czasu	1999	12,9	41,5	30,9	11,1	3,6
		2007 stara ankieta	13,4	27,9	31,2	22,2	5,3
		2007 nowa ankieta	15,3	29,7	31,3	17,1	6,6
	Wypalają co najmniej paczkę papierosów dziennie	1999	1,5	3,7	16,6	75,5	2,7
		2007 stara ankieta	8,3	5,6	10,7	69,7	5,8
		2007 nowa ankieta	9,2	7,6	12,8	62,6	7,7
	Wypijają 1 lub 2 drinki prawie codziennie	1999	6,8	20,2	29,5	39	4,5
		2007 stara ankieta	12,8	17,4	27,9	34,4	7,5
		2007 nowa ankieta	13,1	18,1	26,9	34,5	7,4
	Wypijają 4 lub 5 drinków prawie codziennie	1999	2,5	6,3	18,5	69,2	3,5
		2007 stara ankieta	11,1	3,0	15,6	60,8	9,5
		2007 nowa ankieta	10,3	7,7	19,6	54,3	8,1
	Wypijają 5 drinków lub więcej w czasie weekendu	1999	5,9	15,5	31,6	41,7	5,2
		2007 stara ankieta	12,9	15,4	23,8	37,3	10,5
		2007 nowa ankieta	9,5	12,6	28,0	39,9	10,1
	Próbują 1 raz lub 2 razy marihuany lub haszyszu	1999	11,8	21,2	19,1	40,6	7,3
		2007 stara ankieta	15,8	19,8	18,1	35,6	10,7
		2007 nowa ankieta	16,7	21,8	20,2	28,9	12,4
	Pałą marihuanę lub haszysz od czasu do czasu	1999	6,6	13,4	25,2	47,8	7
		2007 stara ankieta	10,6	13,6	18,9	45,8	11,1
		2007 nowa ankieta	12,9	16,8	22,7	36,0	11,6
Pałą marihuanę lub haszysz regularnie	1999	2	3,5	7,8	81	5,7	
	2007 stara ankieta	9,3	4,7	7,5	67,3	11,2	
	2007 nowa ankieta	8,8	6,7	12,4	59,9	12,2	

poziom klasy			Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Próbują 1 raz lub 2 razy LSD	1999	2,0	3,5	7,8	81	5,7
		2007 stara ankieta	9,3	4,7	7,5	67,3	11,2
		2007 nowa ankieta	8,8	6,7	12,4	59,9	12,2
	Biorą LSD regularnie	1999	3,6	11,8	24,4	48,8	11,4
		2007 stara ankieta	11,2	6,2	19,5	42,8	20,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy amfetaminę	1999	0,8	0,8	4,2	86	8,2
		2007 stara ankieta	X	X	X	X	X
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą amfetaminę regularnie	1999	5,9	14,5	24,2	46,7	8,8
		2007 stara ankieta	9,6	5,7	20,0	46,9	17,9
		2007 nowa ankieta	10,9	11,6	20,4	43,1	14,0
	Próbują 1 raz lub 2 razy kokainy	1999	1,1	0,9	5,4	86	6,7
		2007 stara ankieta	9,7	1,4	5,3	67,4	16,1
		2007 nowa ankieta	8,6	5,8	7,1	64,2	14,3
	Biorą kokainę regularnie	1999	2,5	9	21,7	57,3	9,5
		2007 stara ankieta	11,6	5,2	16,7	46,3	20,2
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy crack	1999	0,8	0,8	2,8	88,8	6,7
		2007 stara ankieta	6,8	1,4	8,3	64,3	19,2
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą crack regularnie	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	7,7	7,1	14,9	44,4	25,9
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy ecstasy	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	6,9	3,3	4,9	63,9	21,0
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą ecstasy regularnie	1999	4,3	11,4	24,7	48,1	11,5
		2007 stara ankieta	9,2	8,0	19,0	44,0	19,7
		2007 nowa ankieta	10,2	12,7	22,9	38,7	15,4

poziom klasy			Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Próbują 1 raz lub 2 razy GHB	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	7,8	4,6	13,7	44,4	29,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą GHB regularnie	1999					
		2007 stara ankieta	6,3	2,9	6,2	58,1	26,6
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy narkotyki w zastrzykach	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	7,2	4,3	13,8	54,1	20,6
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą narkotyki w zastrzykach regularnie	1999	X	X	X	X	X
		2007 stara ankieta	6,8	3,3	5,3	65,2	19,5
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Próbują 1 raz lub 2 razy środków wziewnych	1999	2,9	10,1	23,1	52,3	11,5
		2007 stara ankieta	9,1	8,7	14,9	41,9	25,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
	Biorą środki wziewne regularnie	1999	0,9	0,6	4,8	84,2	9,5
		2007 stara ankieta	7,0	2,5	12,0	55,6	22,8
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X

## 6. Wiarygodność wyników

Tabela 28. Poziom zaufania respondentów

poziom klasy			Już to napisałem w tej ankiecie	Zdecydowanie tak	Chyba tak	Chyba nie	Zdecydowanie nie
Trzecie klasy gimnazjum	Przyznanie się do używanie marihuany lub haszyszu	1999	22,0	34,0	28,5	5,4	10,2
		2007 stara ankieta	26,5	38,3	22,1	4,3	8,7
		2007 nowa ankieta	20,5	40,6	29,6	5,5	3,9
	Przyznanie się do używanie heroiny	1999	13,9	35,5	31,2	6,7	12,6
		2007 stara ankieta	21,0	37,7	22,6	6,7	11,9
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X
Drugie klasy szkół pogimnazjalnych	Przyznanie się do używanie marihuany lub haszyszu	1999	27,5	40,8	22,9	3,5	5,3
		2007 stara ankieta	35,1	36,3	19,6	2,3	6,7
		2007 nowa ankieta	23,4	39,3	25,1	5,9	6,2
	Przyznanie się do używanie heroiny	1999	11,9	47,3	27,7	5,5	7,5
		2007 stara ankieta	26,6	39,2	20,1	4,7	9,4
		2007 nowa ankieta	X	X	X	X	X